לוח אחוזי הערלה בפירות חורף והדרים - תשע"ו תשע"ז

ד"ר משה זקס

לתועלת הציבור

בית המדרש מפרסם מידע חודשי על אחוזי הערלה המצויים בשוק.
במשרדי "בית המדרש" בטלפון 02-6488888 שלוחה 32.

המידע מבוסס על לוחות אחוזי הערלה הכלליים המתפרסמים
ב"הליכות שדה" בעריכת ד"ר משה זקס.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אבוקדו	מאלול תשע"ו - אב ע"ז	אוגוסט עד יולי	5861	83250	1.9
טיג*	דמוי גליל, קטן ודק יותר	אוגוסט סוף ספטמבר	53	30	!29.4
דיי*	דמוי גליל, קטן ודק יותר	אוגוסט סוף ספטמבר	30	100	7.5
גליל	כמו אטינגר בהיר וחלק יותר	סוף אוגוסט	139	2100	0.63
אטינגר	קליפה דקה, אגסי, בהיר	אמצע ספטמבר עד סוף דצמבר	627	16000	0.92
פוארטה וחורשים	קליפה דקה, אגסי, ירוק	נובמבר עד סוף מרץ	18	9500	0.07
פינקרטון (כולל פינו)	אגסי, מחוספס, ירוק (כולל פינו, חלק יותר)	דצמבר עד סוף מרץ	365	13000	0.75

*אחוז גבוה של ערלה! יש לחשוש לאיסור "קבוע".

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
האס	קליפה עבה, מחוספס, קטן, שחור מעט אגסי	נובמבר עד סוף יולי	3013	27000	3.2
ארד	דומה להאס אך ירוק	אפריל עד סוף דצמבר	62	2200	0.75
ניר, גיל ואורית	דומים להאס אך גדולים יותר	דצמבר עד סוף אפריל	0	200	0
נאור	דומה להאס אך ירוק	דצמבר עד סוף אפריל	11	200	4
זנים חדשים	דומים להאס גדולים יותר: ג'ם, בי אל 122, הרבסט ועוד	אפריל עד סוף דצמבר	770	0200	9.3
סך הכל האס ודומיו		אפריל עד דצמבר	3856	29800	3.44
נבאל	קליפה עבה, גדול, ירוק, עגול	ינואר עד סוף מאי	0	700	0
ארדיט	דומה לפוארטה, אך פחות ארוך	ינואר עד סוף מאי	55	5000	0.29
מוטי*	דומה לאטינגר	ינואר עד אפריל	17	20	!18.4
וורץ	דומה לפוארטה, מבריק יותר	פברואר עד סוף מאי	0	300	0
ריד	קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול מעוגל	מרץ עד סוף יולי	701	6700	2.55

*אחוז גבוה של ערלה! יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
אגס	ספדונה משווק מקירור (יש גם ייבוא)		90	14000	0.1
אוכמניות*	יש ייבוא בשימורים. ערלה מסורים	אוגוסט עד סוף אוקטובר		100	!30
אנונה		אוגוסט עד סוף פברואר	10	700	0.45
אפרסמון ס"ה		ספטמבר עד סוף דצמבר	250	18000	0.14
טריומף	פחוס עם אונות, עובר הבחלה	אוקטובר עד סוף דצמבר	250	17000	0.14
אפרסק	אפיל,ציפה לבנה (ספטמבר וסקרלט סנואו)	אוגוסט, ספטמבר	200	6500	1.25
שוגר ווייט לידי	כמו בבקוק אך גדול	יולי	15	2500	0.2
סמרסנואו	כמו בבקוק אך גדול	יולי	290	5200	2.23
הרמוזה	ציפה לבנה, מאורך, גדול	יולי, אוגוסט	30	3000	0.38
12-198 ורובידו	דמוי סמרסט, צהוב עם לחי אדומה	יולי, אוגוסט	-	50	-
סמרסט ופיירטיים	ציפה צהובה, גדול מאוד	ספטמבר	-	50	-

*יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
ספטמבר וסקרלט סנואו	ציפה לבנה	ספטמבר	200	6500	1.25
נקטרינה	ציפה לבנה	אוגוסט, ספטמבר	650	8700	3.6
ארטיגלואו, קווין ג'יאנט, סויטי	ציפה לבנה, בינוני	יולי	150	3600	1.9
אינדפנדס, נקטרד, ארלי סנגרנד, פלברטופ	ציפה צהובה	יולי	-	700	-
פנטזיה	ציפה צהובה, גדול	סוף יולי עד אוגוסט	100	2000	1.7
פליימקיס	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט	-	50	-
פרליין	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	200	-
אוטמפרי	ציפה צהובה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-
הונייגולד	ציפה צהובה, קטן, צהוב	ספטמבר	-	50	-
זנים חדשים אפילים	ציפה לבנה, גדול	אוגוסט, ספטמבר	650	8700	3.7
באבאקו	ראה פאפיה				
גויאבה	יתכן גם מסורים	ספטמבר, אוקטובר	90	2200	0.65 -0.75

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
גויאבה תותית		ספטמבר עד סוף נובמבר	4	24	2
זית מאכל	גדול, בשימורים כל השנה	ספטמבר, אוקטובר	100	21800	0.13
זית לשמן ס"ה	השמן משווק כל השנה	ספטמבר עד סוף דצמבר	2000	66000	0.65
זית ברנע	בעיקר לשמן		100	10500	0.36
סורי ועוד			1900	55500	0.95
חבוש		ספטמבר עד סוף דצמבר	10	500	0.36
חרוב		אוקטובר עד סוף דצמבר			0
ליטשי	פרי אדום	יוני עד אוגוסט	190	3300	0.53
מנגו		יולי עד סוף נובמבר	600	19000	0.1
נקטרינה	ראה אפרסק				

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
ענבים ללא חרצנים					
סופיריור	ירוק, גדול, מעוגל	יוני עד אוגוסט	432	6000	1.4
פליים סידלס	אדום	יוני עד אוגוסט	50	800	1.5
637 (ספרינג בלאש)	אדום כהה, מאורך	יוני, יולי	-	50	-
אדומיניק	אדום כהה	יוני, יולי	-	45	-
סייבל	שחור בינוני	אוגוסט	80	550	3.6
יערה	שחור, לא גדול	יוני עד אוגוסט	-	50	-
מידנייט[1]	שחור מאורך (כנראה הרוב בפיקוח)	יולי	45	400	2.8
זנים נסיוניים	(כנראה הרוב בפיקוח)		100	400	6.2
רוקי (253)	ירוק	יולי	90	400	5.6
מליסה	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (כנראה בפיקוח)	יולי עד ספטמבר	28	90	7
סולטנינה (תומפסון)	ירוק, צהוב, מאורך	יולי עד נובמבר	50	7400	0.1

1 בזן זה רוב ערלה או חשש לקבוע - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

הדרים

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
קרימסון	אדום ענב בינוני	אוגוסט, ספטמבר	75	2600	0.54
664 וזן חדש אוטם קריספ	ענב לבן מאורך, נטיעה נסיונית (הרבה בפיקוח)	אוגוסט, עד סוף ספטמבר	408	950	9.3-10
אוטם רויאל	ענב שחור, נסיונית (כנראה בפיקוח)	אוגוסט, ספטמבר	62	270	4.6
בלק פינגר (149)	שחור גדול וארוך	ספטמבר	-	110	-
סקרלוטה	אדום, גדול, אובלי	ספטמבר, אוקטובר	140	1000	2.8
אוטם רויאל	ענב שחור, נסיונית (כנראה בפיקוח)	אוגוסט, ספטמבר	62	270	4.6
בלק פינגר (149)	שחור גדול וארוך	ספטמבר	-	110	-
סקרלוטה	אדום, בינוני עד גדול, אובלי	ספטמבר, אוקטובר	140	1000	2.8

ענבים עם חרצנים					
מוסקט המבורגי	אדמדם-אדום, טעם מוסקטי	יוני עד אוגוסט	5	600	0.2
דבוקי	צהוב	אוגוסט, ספטמבר	-	200	-
איטליה	ירוק, גדול, מוסקט	אוגוסט, ספטמבר	-	100	-

1 בזן זה רוב ערלה או חשש לקבוע - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
זאני	ירוק, אליפטי גדול	ספטמבר, אוקטובר	100	4000	0.42
חילוואני	אדום	ספטמבר, אוקטובר	0	550	0
רד גלוב	אדום סגול עגול	ספטמבר, אוקטובר	20	3000	0.1
אוטם בלאק	שחור	אוקטובר	17	60	4.7
פיג'ואה	צורת ביצה, ירוק חמצמץ	נובמבר, דצמבר	0	25	0
פיטאיה ס"ה	קקטוס, פרי בצורת ביצה		39	490	3.3
פיטאיה צהובה	עם ציפה צהובה	דצמבר עד סוף מרץ	0	30	0
פיטאיה פרי עדן	אדום וגם לבן, בליטות צבעוניות	מאי עד סוף דצמבר	29	340	3.6
פיטאיה עמודית	(קובו) פרי חלק, גם סורים	יוני עד סוף ספטמבר	10	120	0-0.5
פסיפלורה	ראה "שעונית"				
פפאיה	רוב ערלה!				!80

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
צבר	חשש להשתרשות עלים, חלק ניכר בפיקוח		425	4800	3.1-4
קיוי (אקטנידיה)	צורת ביצה, חום אדום	ספטמבר עד סוף ינואר כל השנה משווק מקירור	40	1860	0.2
קרמבולה*	צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעות	ספטמבר עד סוף אפריל	10+10	68	!15
רימון ס"ה - כולל סורים		אוגוסט עד סוף ינואר	400	26000	0.1-0.2
שזיף אירופי		מאי עד אוקטובר	50	1800	0.3
שזיף יפני ס"ה	עגול		644	18880	0.43
ויקסון	ירוק צהוב, קצת מאורך	יוני, יולי	4	300	0.2
קלסי	ירוק, חלל בקצה גלעין	יולי	-	300	-
לרודה, נוביאנה, אמברה, בלק אמבר	סגול	יולי	-	1000	-
בלק דיימונד	שחור, ציפה אדומה, גדול	יולי	80	3000	0.36
קוין רוזה	ארגמן, גדול	יולי	-	300	-

* בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
פרייר	גדול, פחוס, כהה	יולי	-	800	-
סנגולד	ירוק צהוב, עגול	יולי	80	2200	0.46
קסלמן	אדום, קצת מאורך	יולי	-	50	-
ניו יורקר	שחור	סוף יולי	20	520	0.46
גולדן קינג	צהוב, קטן	אוגוסט	-	200	-
אנג'לנו	פחוס סגול, (דומה לזן נוביאנה אך לא כהה)	אוגוסט	-	400	-
רדרוזה	ארגמן, עגול, גדול יחסית	אוגוסט	-	50	-
בלק ג'ם (440)	שחור, ציפה בהירה, גדול	ספטמבר	250	3900	0.68
שיזף		אוגוסט עד סוף אוקטובר	1	310	0.1
שעונית* (פסיפלורה)		יולי עד סוף דצמבר	230	1200	!40
שקד	יבול ללא קליפה יש גם יבוא	ספטמבר עד סוף נובמבר	2820	55000	1.2

* בזן זה קיים רוב ערלה או חשש ל"קבוע" - שעצי הערלה נפוצים ברוב המקומות.

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
תאנה ארגמנית		מאי עד סוף דצמבר	130	1600	1.1
תאנים אחרות		מאי עד סוף נובמבר	30	1100	0.6
תמר יבש		ספטמבר עד סוף נובמבר	1250	18000	0.2
תמר לח		אוקטובר עד סוף ינואר	15	4200	0.1
תפוח	ראה אחרי טבלת ההדרים				

לוח 2 - הדרים

תפוז					
טבורי וושינגטון			0	2400	0
ניוהול	עם טבור קטן, דומה לשמוטי	ספטמבר עד סוף דצמבר	400	9000	0.4
טבורי אפיל, גדול (סמי, גילנברג, ראוסטנברג, נבלייט, ציפי, קמבריה)		ינואר עד סוף אפריל	1130	13000	0.97
המלין (לתעשיה)		ינואר עד סוף מרץ	0	350	0

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
שמוטי		נובמבר עד סוף מרץ	250	16000	0.21
תפוזי דם		נובמבר עד סוף מרץ	2	1000	0.03
ולנסיה רגילה		אפריל עד סוף מאי	300	6500	0.36
ולנסיה בכירה דלתא מידנייט		ינואר עד סוף אפריל	226	280	4.5
אשכולית לבנה		ספטמבר עד סוף מאי	61	10000	0.04
אשכולית אדומה		ספטמבר עד סוף מאי	15	28000	0.01
פומלית		ספטמבר עד סוף ינואר	110	8000	1.1
פומלה אדומה צ'נדלר		ספטמבר עד סוף ינואר	2	900	0.03
רדסון (זן חדש)		נובמבר עד סוף ינואר	0	100	0
פומלה לבנה גולית		ספטמבר עד סוף מאי	593	4100	1.2

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
קליפים קטנים					
אדמוני		ספטמבר עד סוף אוקטובר	0	110	0
קלמנטינה	ירוק כתום	ספטמבר עד סוף דצמבר	0	110	0
מיכל		אוקטובר עד סוף דצמבר	755	1030	0.97
מירב	כמו מיכל אך גדול	דצמבר עד סוף ינואר	120	3300	0.48
וינולה		דצמבר עד סוף מרץ	0	140	0
קליפים בינונים					
ראשון		ספטמבר אוקטובר	68	500	1.5
קרוולהייס ומריסול		ספטמבר עד סוף אוקטובר	0	30	0
אלנדייל		דצמבר עד סוף פברואר	0	30	0
סטסומה רגילה		אוקטובר עד סוף דצמבר	0	320	0
סטסומה בכירה	דל זרעים	ספטמבר עד סוף נובמבר	122	2200	0.54

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
עידית		אוקטובר עד סוף דצמבר	12	350	0.46
נובה כולל סנטינה, ינוב		אוקטובר עד סוף ינואר	50	10500	0.06
אור כולל אורה* ושני		דצמבר עד סוף מרץ	6600	90000	1.2
נקטר		דצמבר עד סוף ינואר	0	50	0
מורקוט		דצמבר עד סוף מרץ	260	3000	0.87
מור		דצמבר עד סוף מרץ	6	1000	0.08
הדס		ינואר עד סוף מרץ	60	1500	0.63
אודם, כולל יפעת, דנה, מאמה, קדם		ינואר עד סוף מרץ	160	6800	0.3

קליפים גדולים

מינאולה		דצמבר עד סוף מרץ	380	5500	0.7
תמי		נובמבר דצמבר	5	550	0.1
טמפל		דצמבר עד סוף מרץ	0	100	0
טופז (אורטניק)		פברואר עד סוף אפריל	10	2500	0.4

* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע ומצוי במרבית האזורים. (אבל אם מצרפים את הזמן שהעץ גדל במשתלה תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה).

מין וזן	תכונות ותיאור	זמן קטיף	נטיעת תשע"ד (דונם)	השטח הכללי (דונם)	% ערלה
לימוניים					
לימון		נובמבר עד סוף אפריל	2020	28000	1.26
לימה (ליים)		יולי עד סוף נובמבר	268	1600	1.8
לימקואט		יולי עד סוף ינואר	0	50	0
קומקואט		מאי עד דצמבר	10	400	0.2

לקבלת עדכוני כשרות בוואטסאפ
050-264-9789

פירוט אחוזי הערלה בתפוחי עץ

בשאר הזנים פחות מ 0.5% ערלה

שם הזן	עד סוף חודש כסלו ע"ז	מתחילת חודש טבת ע"ז
אורליאן	-	-
אין כמוהו	-	-
גלה	1.9	0.1
גרני סמית (וגרנד)	עד סוף טבת 1.8%	מתחילת שבט 0.2%
דלישס אדום	0.2	0.05
זהוב	0.5	0.1
יונתן	1.5	0.1
מולינג דלישס	-	-
פינק ליידי	עד סוף טבת 10%	מתחילת שבט 0.2%

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים (וכן חלק ניכר מהאפרסק, נקטרינה, תפוח וחלק מאפרסמון וענבים). כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו (גם בתפוח רגיל ועוד). למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב הנטיעות הדו שנתיות וללא התחשבות בהשגחה. וזאת כיוון שיש בכך מידע המועיל אף להשגחות מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.